

## LiveUP Arteristic

Botanical Beverage Mix of


Campuran Minuman Botani Anggur dan Teh Hijau

Met WT | Beed Bersh x 109 by 40

## LiveUP Arteristic


轻松管理胆固醇 让心脏永葆活力





## 人体3个永不休息 的器官之一












摩多







有力










管道通畅














#### 高血压





心脏衰弱

从爱心脏开始



一人痛苦 全家辛苦 爱家庭

中风



保护心脏



运动



# 达致 爱心3部曲



2 软化血管




3 加强心肌功能

### **ARTERISTIC** 爱心3部曲



穆库尔 Commiphora Mukul



Kionutrime-Cs

#### 1) 降低坏胆固醇,三酸甘油脂

#### 穆库尔 Commiphora Mukul

(印度特产,天然树脂,能有效降低坏 胆固醇,三酸甘油脂,预防冠状动脉 疾病(coronary artery disease))

#### **Kionutrime-Cs**

(很强的脂肪吸附能力,可吸附比自体重 量超过600倍的脂肪。阻止脂肪在肝脏 和肌肉的储存)

## ARTERISTIC 爱心3部曲



**松树皮提取物** Pine Bark Extract



**葡萄籽提取物** Grape Seed Extract (OPC's)



#### Ⅱ) 软化血管

#### 松树皮提取物 Pine Bark Extract

(原花青素,是一种水溶性的抗氧化剂。 已证实预防低密度脂蛋白-胆固醇引起的 氧化效应,降低心脏病的风险。)

#### 葡萄籽提取物 Grape Seed Extract (OPC's)

(能提高视力,让关节灵活,维持人体动脉和组织(如:心脏)的健康,并强健毛细血管和静脉,以及改善您的血液循环系统。)


## **绿茶提取物**Green Tea Extract

(含儿茶素多酚, EGCG, 是一种抗氧化剂, 它能杀死癌细胞,但不危害正常细胞, 也能抑制癌细胞的生长。)

### **ARTERISTIC** 爱心3部曲



左旋肉碱富马酸盐 L-Carnitine Fumarate



辅酶 Q10 Coenzyme Q-10

#### III)加强心肌功能

#### 左旋肉碱富马酸盐 L-Carnitine Fumarate


(将脂肪酸转化成能量,并提供给肌肉和 身体活动所需,有利于心脏和血管的部 分如改善胸痛。)

#### 辅酶 Q10 Coenzyme Q-10

(是一种很强的抗氧化剂。一般上,心 脏病的人都缺乏辅酶Q10。因此,当心肌 病和心脏衰竭的人服食辅酶Q10有效帮助 维持心肌和心脏健康。)

# ARTERISTIC 的主要功效:

降低坏胆固醇,三酸甘油脂





之前



之后

ARTERISTIC 实验

## 服用方式

对于高胆固醇的人, 一天一包,以室温水冲泡。

对于胆固醇指数理想的人,隔天服用一包,以室温水冲泡。

\*孕妇,喂食哺乳的妇女

\*在过去6个星期内接受器官移植或动大型手术







- \*在服食Arteristic时, 不鼓励和其它降胆 固醇药物一同服用。
- \*若想摄取应先咨询 营养师等专业人士。





**Before** 

**总胆固醇**: 7.90 mmol/L

Chen Pei Ling, 34岁

> 服用 **Arteristic 12**天后



After

**总胆固醇:** 5.80 mmol/L



Chow Yean Ti, 27岁

> 服用 **Arteristic** 1**4**天后



**Before** 

**总胆固醇:** 5.0 mmol/L



After

**总胆固醇**: 4.44 mmol/L



Tan Chiat Ling

服用 **Arteristic** 14天后



Before

**总胆固醇:** 5.01 mmol/L



After 总胆固醇: 3.30 mmol/L



Liew Po Fong, 58岁

> 服用 **Arteristic 14**天后



**Before** 

**总胆固醇**: 6.0 mmol/L



After 总胆固醇: 4.5 mmol/L







Lee Yeen, 47岁 Kuala Lumpur

> 服用 **1盒** Arteristic后



**Before** 

**总胆固醇:** 5.00 mmol/L



**After** 

**总胆固醇:** 3.90 mmol/L



BLOCK G-3-1&2, PUSAT PERDAGANGAN KOTA DAMANSARA NO 12 JALAN PJU 5/1 KOTA DAMANSARA 47810 PETALING JAYA SELANGOR



